

Description d'une opération

Cæsarienne


existence des appendices uterins

En mars 1792.

204

ARC 27 d 1

no 1



1
operation caesarienne

pratiquée a Besançon le dix mars mil Sept cent
quatre vingt deux, dont les suites ont donné lieu a
observer encore dans la matrice, les appendices
uterines dans leur plus grand relief.

une fille d'environ vingt un an, forte maigre et rachitique,
se rendit le soir la veille du dit jour, a la maison de Bellevaux
pour y faire des couches; les sœurs furent averties avec la
maîtresse sage femme a se rendre le même soir, et elles y passeront
la nuit. pendant la quelle cette créature étant en travail perdit
les eaux, la tête du fœtus a terme présentant le sommet au
détroit supérieur: les douleurs discontinuerent totalement, et la
tête n'avançant pas; on me fit avertir de m'y rendre: et j'arrivai
a neuf heures et demie du matin; après m'être assuré de la conformation
extérieure du bassin, je me mis en devoir d'exécuter cet accouchement
avec le forceps. cette fille mise en situation convenable pour être
opérée, je reconnus bien tôt par le toucher, l'impossibilité de
l'accouchement par les voyes ordinaires, le détroit antero-postérieur
n'ayant gueres que deux pouces de diamètre: par cela je fis remettre
cette infortunée dans son lit, en attendant que j'eusse prié la plus
part de mes confreres a se rendre a la salle des femmes en couches
afin qu'ils jugeassent par eux même de l'état des choses et de
la nécessité de l'opération: j'invitai également mr flamand
chirurgien major du Régiment 105 actuellement en garnison
a Besançon qui s'y est acquis une réputation, surtout parmy
les sœurs en chirurgie, dont mes fils sont du nombre, et auxquels
il a fait gratuitement plusieurs leçons et démonstrations anatomiques
ayant été lui même cy devant un des sœurs distingués du
sageur mr. Delvaux



Ces messieurs a leur arridee touchèrent la malade: et Mr flamand
estima le diamètre antero postérieur être seulement de deux pouces, —
deduction faite de l'épaisseur du pubis: de sorte que l'opération
fut résolue pour les deux heures après midy:

a notre retour, nous dissertames un moment sur les diverses
méthodes pratiquées au sujet de l'opération caesarienne que j'allais
entreprendre: les avis se réunirent pour l'incision latérale plutôt
qu'à côté de la ligne blanche afin d'éviter le danger de
l'hémorragie que je redoutois, par la raison exposée dans mon
précédent mémoire sur l'organisation de la matrice.

je commençai par tracer au moyen du pied de roy l'étendue de
l'incision sur la partie latérale droite de l'abdomen dans une espace
de sept pouces, de manière cependant qu'elle devoit se faire a un
pouce au dessus du niveau de l'ombilic, et a une distance raisonnable
du bord externe du muscle droit, en reportant un peu obliquement
vers le bas, dans la direction du bord antérieur et interne de la cavité
cotyloïde: Mr flamand tint la matrice assujettie en la déterminant
à s'incliner davantage du côté droit: alors armé d'un bistourix
convexe, je fis a divers reprises l'incision aux tegumens et aux
graisse, selon l'étendue déterminée précédemment: j'en agis de même
à l'égard de celle des muscles abdominaux jusqu'à ce que
j'eusse découvert la matrice: prenant ensuite un bistourix droit
boutonné, je rendis l'incision des muscles, parallèle dans toute son
étendue avec celle de la peau: mais l'épiploon et les intestins
n'échaperent avant que je n'eusse parachevé la supérieure:
après que ces parties furent réduites et retenues en place, je vis que
la matrice se presentoit a la playe, presque par sa partie

Laterale; que le ligament rond cotoyoit presque dans toute son étendue.
 j'avertis Mr flamand de pousser davantage le corps de la matrice afin
 de le faire saillir davantage par l'écartement des bords de la plaie et
 qu'en présentant une plus large surface, je pusse pratiquer l'incision
 de l'utérus plus antérieurement; après quoy, avec le bistouris courbe
 je commençai l'incision sur la partie la plus saillante et moyenne
 de la surface qui se presentoit, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans
 la matrice dont les caux étoient écoulés longtemps au paravant,
 de sorte que l'enfant avoit déjà rendu une grande partie de son
 mœconium: ensuite reprenant le bistouris droit, je prolongeai
 l'incision vers l'orifice, de manière que mon doigt luy servant de
 conducteur, je sentois l'épaisseur de la matrice diminuer à mesure que
 je la prolongeais vers le bas, avec l'attention cependant de la rendre
 plus courte d'un pouce et demi à peu près, que celle de l'extérieur.
 dirigeant ensuite l'incision vers le haut et faisant ensuite de faire
 repousser à moy une partie du fond de la matrice afin d'aggrandir
 l'incision vers la partie supérieure, et de regagner par ce moyen
 l'étendue de celle qu'à dessein je n'avois pas voulu davantage
 prolonger vers le bas, je trouvai que la matrice augmentoit
 d'épaisseur vers son fond, qui me parut être à peu près de
 six lignes, tandis qu'en bas elle ne paroissoit être que de deux;
 et qu'à mesure que l'incision se dirigeoit vers le fond,
 le tranchant du bistouris éprouvoit une résistance qui se fit
 entendre des assistants qui étoient en très grand nombre, telle
 qu'on l'éprouve souvent dans la section d'une partie tendineuse
 ou aponeurotique: ce qui vient à l'appuy de mon opinion au
 sujet de la nature de la fibre utérine, telle que j'éloy exprimé
 dans mon précédent mémoire.



Le fœtus presentoit a l'incision le dos et les lombes recouverts des membranes: je le tirai ainsi replié avec deux doigts de chaque main placés sous les fausses côtes: il donna des signes de vie qui ne se soutinrent pas longtems après la disparition du cordon: le placenta étoit implanté vers la partie laterale gauche et postérieure du fond de la matrice, et je le detachai avec facilité.

La partie antérieure du corps des vertèbres lombaires etant inclinée et contournée a gauche dans le sujet qui a donné lieu a cette operation, conjointement avec l'iléon du même côté, le bassin se trouvoit par conséquent placé diagonalement de maniere que la hanche droite étoit plus antérieure que l'autre; le corps de la matrice qui avoit suivie cette direction, presentoit donc a l'incision la partie laterale moyenne, a quoy je ne m'attendois pas: ce qui me mit dans le cas de faire mon incision plus — lateralement que je n'eusse voulu, a cause des vaisseaux iliaques uterins qui vont se rendre en cet endroit, de sorte qu'à peine elle se trouva éloignée de deux travers de doigt de l'insertion supérieure et antérieure du ligament large: malgré cela, il ny parut aucun jet de sang formé par la section des artères uterines, comme je m'attendois a en voir partir plusieurs, comme il m'avoit été certifié qu'il devoit en être ainsi, par des personnes qui avoient eu l'occasion d'assister a des semblables — operation faites a paris, dans le tems qu'ils y frequentoient les écoles.

La seule artère qui fournit un jet de sang, fut une musculaire d'un moyen calibre, qui fut coupée vers le tiers inférieur de la playe, et qui etant saisie a son ouverture fut liée d'un simple fil.

je ne laissai pas cependant de favoriser le rapprochement des vaisseaux de la surface de la paroi de la matrice d'un côté, avec une éponge trempée d'eau et de vinaigre, et même avec des petites pelottes de neige, que je venois de faire recueillir: parce moyen on fut étonné de voir si peu de sang répandu, au dehors après une pareille opération?

j'avois tout préparé pour faire à la playe des tégumens et des muscles la suture enchevillée: mais ce moyen conseillé par le plus grand nombre des auteurs, ne fut pas accueilli par mes assistans, dans l'esperance d'éviter par là des accidens et des gonflemens qui m'auroient peut-être mis dans le cas de la relacher.

quand on n'a jamais dû pratiquer une pareille opération, et que l'on n'a jamais été à portée de voir les succès et les inconvéniens qui peuvent en résulter, on se laisse plus volontiers entraîner par l'opinion des autres, surtout de la part de ceux qui peuvent avoir des idées plus neuves sur une pareille matière, tel que m^r flamand: c'est la cause pour la quelle je n'insistai pas: on se borna donc à favoriser le rapprochement de la playe par un pansement à sec et par un bandage expulsif et contentif, mais bientôt le vomissement survint à la malade qui força cette playe à s'écarter, et à donner issue à l'intestin et à l'épiploon de manière que le soir en renouvelant l'appareil humecté de sang je fus obligé de réduire les viscères dans leur place: et la malade passa cependant la nuit assez tranquillement.

Le lendemain matin en levant l'appareil, nous trouvâmes la surface de l'épiploon et des intestins desséchés par le contact



de la charpie: de plus ils étoient adhérens à toute la circonférence de la plaie, de sorte que je fus obligé de les en décoller avec le doigt: je proposai alors, au moins une compresse fine trempée dans le miel rosat, placée sur la surface des intestins en forme de Syndon, dans la plaie: il fut question tout de nouveau de suture, mais elle fut rejetée à cause de la météorisation qui se manifestoit déjà, et qui menaçoit d'augmenter.

Le vomissement se renouvelant, continua sans grande interruption par la suite: nouveaux efforts par conséquent qui augmentoient la détermination des viscères à leur issue: le Syndon étoit desséché dans la plaie et adhérent à la surface des intestins et de l'épiploon, j'en renouvelai l'application, dont le décoller excita encore de nouvelles douleurs à la malade.

Elle passa la deuxième nuit dans cet état, elle rendit le matin trois vers vivans par le vomissement: le poux étoit irrégulier et fort faible, et elle mourut vers le midy troisième jour de son opération en moins de quarante-six heures du moment où elle fut exécutée, en conservant sa connaissance.

au dire de tous les assistants, l'opération ne pouvoit être mieux faite; à quoy donc attribuer une mort si prompte: doit-on l'attribuer à la faiblesse du temperament, ou à un foyer vermineux dont elle avoit donné des marques, ou plutôt au froissement des viscères contre l'appareil, par le défaut de suture, et si l'Académie daignoit charger quelqu'un de ses membres pour éclaircir cette dernière question, sa décision ne pourroit que l'avenir fixer l'opinion sur la suture?

nous avons tous été étonnés du peu de douleur dont une pareille section a été accompagnée: il est vrai que celle des muscles du bas ventre qui a été la plus longue a excité l'impatience de la malade de la sentir bientôt finie; mais elle ne fit pas une plainte à celle de la matrice lors même que le tranchant de l'instrument trouvoit le plus de résistance à la division de son épaisseur: la sensibilité du corps de l'utérus, n'est donc pas aussi grande que le degré connu de son irritabilité paroît devoir la manifester: et dans deux minutes on pourroit par cette voye terminer l'accouchement sans que la malade jetta un seul cri: tandis que le plus naturel et le plus court ne s'exécute pas sans s'en exprimer plusieurs.

à l'ouverture du cadavre la plaie de la matrice ne répondoit pas à celle des muscles du bas ventre: elle étoit recouverte par le bord externe qui répondoit à celui du muscle droit: il y avoit peu d'épanchement sanguinolent retenu par l'enfoncement formé par le péritoine qui recouvre la partie postérieure de la vessie pour dela remonter contre la partie antérieure de l'utérus, de manière à former par ce moyen une espèce de goulot par lequel les lochies pouvoient rentrer dans la matrice.

Si l'incision des muscles pratiquée obliquement du haut en bas, se rapprochoit par son extrémité inférieure de la ligne blanche: celle de la matrice se trouva faite dans une direction opposée: c'est à dire que si sa terminaison par le haut, étoit à deux travers de doigt à l'opposé de l'insertion du ligament rond antérieurement lors que la



2
Lors que la matrice étoit dans sa distention, et qui en suite s'est
trouvée réduite à son état: par le bas au contraire elle atteignit
le bord latéral, perpendiculaire inférieur de l'utérus ou commence le
ligament large après avoir formé la partie du cul de sac antérieur
dont je viens de parler.

Il est donc étonnant que la section faite si près de la racine
des vaisseaux utérins n'ait pas été suivie d'une effusion de sang
aussi considérable que celle que l'on étoit fondé à redouter.

j'enlevai après cela le bassin avec la matrice, du cadavre pour
les mieux examiner, et les conserver: en conséquence j'ay mis macérer
cette dernière pièce dans de l'eau pour la faire dégorger suffisam-
ment, avant de la mettre dans une liqueur spiritueuse

Comme l'intérieur de son fond étoit en partie rempli de lochies
sanguinolentes qui avoient de la peine à se délayer, j'y versai
d'habitude de jour en jour de l'eau avec une aiguille: à la fin
j'appréciai des filaments flottans dans cette eau, qui tenoient à
la matrice et dont la longueur étoit d'un pouce environ: le
Lendemain 17. mars: je voulus recommencer la même opération
pour faire voir à quelques élèves et dont mes fils sont du nombre
ces filaments lymphatiques excrétoires, qui traversoient auparavant
le placenta, tels que je les avais annoncés précédemment dans
mon mémoire adressé le commencement de ce mois, à l'Académie
de chirurgie, mais ils s'étoient détachés, sans doute à cause de
la longue macération: et comme j'appréciais toujours des
caillots de sang qui ne s'étoient pas détachés, je retournai
le dedans de cette matrice en dehors, ce qui ne se fit pas sans
une dilaceration de l'os fondue d'un pouce, qui prolongea

celle de la partie supérieure de l'incision : je découvris deux caillots de sang durci, suspendus au fond de la matrice sous la forme de petits faux germes de la grosseur à peu près de la dernière extrémité de l'index, ils étoient lisses et solides, formés sans doute par une grappe d'appendices utérins, je les déracinai avec force, après quoy j'en vis une vingtaine d'autres, toutes isolées, de la longueur de deux à trois lignes, du diamètre d'une plume à gerire, qui étoient collées selon leur longueur, contre la parois de la matrice à la quelle ils adhéroient non seulement par leur embouchure aux sinus utérins dont elles partoient, mais encore par les mêmes filaments lymphatiques dont elles étoient tapissées en les tenant ainsi assujettis contre la matrice en partant toute la longueur et au delà des appendices, pour s'y coller ensuite elles-mêmes aux mêmes :

j'arrachai toutes ces appendices veineuses qui se presentoient à moy dans leur plus grand relief. Dans l'intention d'apercevoir l'embouchure des sinus utérins, dont le plus grand nombre déjà trop contractés ne me presentoit rien de bien démonstratif et pour satisfaire ma curiosité j'eus l'indiscrétion de continuer, en observant à quelques unes d'elles l'embouchure du sinus utérin après entrouvertes pour apercevoir le caillot qui communiquoit immédiatement dans leur fond

je me repens le jour suivant d'avoir agi avec si peu de réflexion, car j'avois en main la preuve la plus authentique de l'existence réelle des appendices utérins* et comme je n'ignore pas que l'on ne peut d'agir de détruire des opinions trop généralement adoptées, on ne peut le faire que par des preuves démonstratives cette preuve auroit suffi pour ramener à la mienne ceux qui auroient encore de la peine à s'y rendre; et j'atteste en toute vérité

* qui se sont présentés à moy sous toutes sortes de formes qui ne sont plus équivoques



que qui conque agira suivant les procedes decrits dans mon
memoire qui doit etre actuellement sous les yeux de l'Academie
ne pourra se refuser a l'avenir, a me rendre justice sur la
realite et l'importance de mes decouvertes.

Conscience de puis bien des annies de l'existence de ces
appendices qui degorgent le sang uterin dans les cellules
du placenta, j'e fais toujours la ligature de la veine
ombilicale; elle favorise plus promptement le decollement
du placenta dont la masse alors plus solide offre moins de
resistance aux efforts de la matrice qui tend a s'en debarrasser.
Etc. Etc.


je joins icy la figure et l'etendue du detroit superieur du
bassin. dont le diametre antero-posterieur se porte un
peu obliquement du milieu de la symphyse du pubis, a
celuy du cartilage sacro vertebraal, et de deux pouces
une ligne

de la pointe de l'epine anterieure de l'ilion gauche, jusqu'à
la partie superieure de la douzieme vertebre lombaire qui y
correspond et contournee, la distance n'est que de trois pouces et
demy, tandis qu'il y'a six pouces et demi du cote oppose.

La tete du foetus avoit le diametre ordinaire de trois pouces
un quart d'une tuberosite parietale a l'autre.

Besancon le 25. mars 1792

Nedey —



partie gauche

Contour intérieur du détroit du bassin
dépouillé de ses chairs.



